

GESTIONE TAMPONE POSITIVO per CONTACT TRACING e ISOLAMENTO

Il presente documento ha lo scopo di definire il percorso di prescrizione ed esecuzione dei test diagnostici finalizzati all'attività di contact tracing, di comunicazione dei positivi e di disposizione delle misure di quarantena e/o isolamento.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

CdC Atlanta: Duration of Isolation and Precautions for Adults with COVID-19 Updated 16 August 2020

WHO: Coronavirus (COVID-19) Update N. 32, 26 June 2020 Criteria for releasing COVID-19 patients from isolation,

Circolare 3787 del Ministero della Salute del 31/01/2021

ECdC: Interim guidance on the benefits of full vaccination against COVID-19 for transmission and implications for non-pharmaceutical interventions, 21 April 2021

ECdC: Public health impact of SARS-CoV-2 variants of concern: scoping review protocol, 18 May 2021

CdC Atlanta: Interim Public Health Recommendations for Fully Vaccinated People, Updated May 28, 2021

Circolare 36254 del Ministero della Salute del 11/08/2021

CdC Atlanta: Interim Public Health Recommendations for Fully Vaccinated People, Updated July 28, 2021

ECdC: Contact tracing in the EU: public health management of persons, including healthcare workers, who have had contact with COVID-19 cases –fourth update, 17 November 2021

ECdC: Assessment of the further emergence and potential impact of the SARS-CoV-2 Omicron variant of concern in the context of ongoing transmission of the Delta variant of concern in the EU/EEA, 18th update, 15 December 2021

Position paper SItI, Raccomandazioni della società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica per migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'equità delle azioni di contrasto della pandemia covid-19 nella fase di criticità attuale, 28 Dicembre 2021

Circolare 84773 del Ministero della Salute del 30/12/2021

ABBREVIAZIONI

UOC: Unità Organizzativa Complessa

Test Ag: tampone Ag

PRESCRIZIONE ED ESECUZIONE TEST

L'esecuzione dei tamponi è a carico dell'UOC Patologia Clinica e Medicina Trasfusionale nel punto prelievi dedicato. La gestione dei bambini con tampone positivo è a carico della UOC Pediatria per la parte clinica e del gruppo Covid Territoriale per la gestione dei tamponi.

COMUNICAZIONE e GESTIONE DEI TEST POSITIVI

La UOC Patologia Clinica e Medicina Trasfusionale ha la responsabilità di refertare i tamponi processati. Il Gruppo Covid Territoriale chiama tutti i positivi, prende in carico clinicamente gli adulti e gestisce la programmazione dei tamponi, secondo le appropriate scadenze, dei soggetti sia adulti sia pediatrici (la cui presa in carico clinica è responsabilità della UOC Pediatria). Il Servizio Tracciamento Contatti chiama tutti i soggetti positivi per effettuare l'indagine epidemiologica.

DISPOSIZIONE MISURE QUARANTENA O ISOLAMENTO

La disposizione di quarantena/isolamento è impartita dal Servizio Tracciamento Contatti. Il sanitario che richiede il tampone in paziente sintomatico deve comunicare al soggetto di restare isolato in

GESTIONE TAMPONE POSITIVO per CONTACT TRACING e ISOLAMENTO

attesa dell'esito e avvertire i conviventi di rimanere a casa e adottare le misure di contenimento (mezzi di protezione, distanziamento) fino alla comunicazione dell'esito o alla chiamata per l'inchiesta epidemiologica.

PZ POSITIVO

Se il soggetto è in condizioni di immunodepressione ritenute critiche (trapiantato, terapia oncologica, in terapia immunosoppressiva, etc) deve eseguire il tampone molecolare di fine isolamento dopo almeno 21 gg e comunque dopo 3 gg dalla scomparsa dei sintomi. E' libero con doppio tampone molecolare negativo.

Se il soggetto è positivo e NON VACCINATO è libero con test Ag negativo eseguito dopo 10 gg dalla positività e se senza sintomi da almeno 3 gg. Se il test Ag è positivo resta isolato per altri 7 gg poi libero con test Ag negativo. Se il test è ancora positivo è libero dopo 21 gg senza test.

Se il soggetto è ASINTOMATICO ed ha ricevuto la dose booster o la doppia vaccinazione da meno di 4 mesi o è guarito da meno di 4 mesi, esegue tampone Ag di fine isolamento dopo 7 giorni. Se il soggetto resta positivo, esegue ulteriore tampone Ag dopo altri 7 giorni di isolamento e se ancora positivo è libero dopo 21 gg senza test.

Se il soggetto è SINTOMATICO ed ha ricevuto la dose booster o la doppia vaccinazione da meno di 4 mesi o è guarito da meno di 4 mesi, esegue tampone Ag di fine isolamento dopo 10 giorni (se asintomatico da almeno tre giorni). Se il soggetto resta positivo, esegue ulteriore tampone Ag dopo altri 7 giorni di isolamento e se ancora positivo è libero dopo 21 gg senza test.

In tutti i casi di riscontro di positività al tampone per Sars Cov-2 verrà avviata l'inchiesta epidemiologica per la ricerca dei contatti stretti, i quali verranno sottoposti alla ricerca del virus e a periodo di quarantena al fine di identificare e circoscrivere precocemente i focolai di infezione.

CONTATTO STRETTO FAMILIARE**NON VACCINATO:**

Esegue test Ag a tempo zero e dopo 10 giorni.

Quarantena vera fino al tampone finale.

VACCINATO O GUARITO INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA DI VACCINATO O GUARITO:

A discrezione dei sanitari del Covid Team, in base all'eventuale sintomatologia o alle insicure condizioni di isolamento familiare, test Ag a tempo zero e a fine tempistica del soggetto isolato che vive nella stessa casa.

Non è sottoposto a quarantena, ma dovrà rispettare rigorosamente l'isolamento dal convivente positivo (se possibile anche con cambio di domicilio) e adottare le seguenti misure di prevenzione:

- uso della mascherina FFP2
- frequente igiene delle mani
- mantenimento del distanziamento e arieggiamento dei locali in cui sosta

È tenuto inoltre ad evitare di partecipare ad occasioni di convivialità durante le quali non sia possibile l'utilizzo della mascherina e a condividere spazi con soggetti fragili e a più alto rischio di sviluppare forme gravi di malattia (ad esempio persone di età superiore ai 65 anni e/o con malattie croniche)

Qualora il soggetto diventi SINTOMATICO o si tratti di soggetto a rischio per condizioni cliniche (immunosoppressione) o professionali (operatori sanitari) va sottoposto a test Ag o molecolare a 5 giorni dal contatto.

DATA 25/01/2022

Approvato da:

Direttore Generale ISS e Direttore Attività Sanitarie e Socio Sanitarie

Dr. Sergio Rabini

Firma:

